



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 28.06.2021)

Ertragsreben

| Sorte | Kenn-Nr.: |
|-------------------------------|-----------|
| <u>'Felicia'</u> | RBE 171 |
| <u>'Cabernet Cantor'</u> | RBE 251 |
| <u>'Cabertin'</u> | RBE 276 |
| <u>'Sauvignon Blanc'</u> | RBE 292 |
| <u>'Roter Riesling'</u> | RBE 309 |
| <u>'Donauriesling'</u> | RBE 745 |
| <u>'Goldmuskateller'</u> | RBE 747 |
| <u>'Rosenmuskateller'</u> | RBE 748 |
| <u>'Calardis Blanc'</u> | RBE 801 |
| <u>'Roter Müller Thurgau'</u> | RBE 1008 |
| <u>'Rosa Chardonnay'</u> | RBE 1022 |
| <u>'Sauvitage'</u> | RBE 1053 |
| <u>'Trebiano di Soave'</u> | RBE 1066 |

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 15.12.2020)

Weißer Ertragsrebsorte 'Felicia', Kenn-Nr.: RBE 171

Züchter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Julius Kühn-Institut,
 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Erwin-Baur-Straße 27,
 06484 Quedlinburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|---|---|-------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | mittel | 5 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | mittel bis dicht | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | sehr gering bis gering | 2 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | gelbgrün | 1 |
| Wüchsigkeit | mittel | 5 |
| Geiztriebbildung | mittel bis stark | 6 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel | 5 |
| - Verrieselungsneigung | gering | 3 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering bis mittel | 4 |
| - Zahl der Lappen | drei | 2 |
| - Anordnung der Stielbuchtlappen | halb offen | 3 |
| - Anthocyanfärbung der Hauptadern auf der Oberseite | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Traube | | |
| - Größe | groß | 7 |
| - Dichte | mittel bis dicht | 6 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | früh | 3 |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | gelb | 3 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | sehr gering bis gering | 2 * |
| - Oidium | gering | 3 * |
| - Botrytis | gering bis mittel | 4 * |
| Mostgewicht | mittel bis hoch | 6 |
| Mostsäuregehalt | gering bis mittel | 4 |
| Traubenertrag | hoch | 7 |
| Holzausreife | hoch | 7 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - x) |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | gelbgrün | 2 |
| - Geruch | duftig/neutral | 2/3 |
| - Geschmack | fruchtig/neutral/harmonisch | 6/4/3 |

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar. [\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 29.01.2019)

Rote Ertragsrebsorte 'Cabernet Cantor', Kenn-Nr.: RBE 251

Züchter: Land Baden-Württemberg vertreten durch Staatliches Weinbauinstitut,
Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|---------------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | mittel | 5 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | dicht bis sehr dicht | 8 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering bis mittel | 4 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | gelbgrün | 1 |
| Wüchsigkeit | mittel | 5 |
| Geiztrieb Bildung | stark | 7 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel | 5 |
| - Verrieselungsneigung | gering | 3 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | groß | 7 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering bis mittel | 4 |
| - Zahl der Lappen | drei | 2 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | leicht offen | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | sehr gering bis gering | 2 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Dichte | locker bis mittel | 4 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | früh bis mittel | 4 |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Form | breit ellipsoid | 3 |
| - Hautfarbe | blauschwarz | 9 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | gering bis mittel | 4 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | dunkelbraun | 3 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | sehr gering bis gering | 2* |
| - Oidium | sehr gering bis gering | 2* |
| - Botrytis | gering | 3* |
| Mostgewicht | mittel bis hoch | 6 |
| Mostsäuregehalt | mittel | 5 |
| Traubenertrag | gering bis mittel | 4 |
| Holzausreife | hoch | 7 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | ^{x)} |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | dunkelrot | 3 |
| - Geruch | fruchtig/duftig | 4/3 |
| - Geschmack | fruchtig/würzig/körperreich | 6/7/5 |

^{x)} nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.04.2017)

Rote Ertragsrebsorte 'Cabertin', Kenn-Nr.: RBE 276

Züchter: Volker Freytag, Theodor-Heuss-Straße 78, 67435 Neustadt

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | mittel bis spät | 6 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | mittel | 5 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | mittel | 5 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | dunkelkupferrot | 5 |
| Wüchsigkeit | mittel bis stark | 6 |
| Geiztrieb Bildung | stark | 7 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel bis spät | 6 |
| - Verrieselungsneigung | gering bis mittel | 4 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Blasigkeit der Oberseite | mittel | 5 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | leicht überlappt | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | mittel bis hoch | 6 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Dichte | locker bis mittel | 4 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | früh bis mittel | 4 |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Form | breit ellipsoid | 3 |
| - Hautfarbe | blauschwarz | 9 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | sehr gering bis gering | 2 |
| - Besonderer Geschmack | krautiger Geschmack | 4 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | sehr gering bis gering | 2* |
| - Oidium | gering bis mittel | 4* |
| - Botrytis | gering | 3* |
| Mostgewicht | mittel bis hoch | 6 |
| Mostsäuregehalt | mittel | 5 |
| Traubenertrag | gering bis mittel | 4 |
| Holzausreife | hoch bis sehr hoch | 8 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - ^{x)} |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | dunkelrot/braunrot | 3/4 |
| - Geruch | duftig/fruchtig | 3/4 |
| - Geschmack | würzig/körperreich/fruchtig | 7/5/6 |

^{x)} nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.04.2017)

Weißer Ertragsrebsorte 'Sauvignon Blanc', Kenn-Nr.: RBE 292

Züchter: Michael Kimmig (Rebschule Kimmig), Grünstadter Straße 4, 67271 Obersülzen

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh | 3 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | mittel bis dicht | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering bis mittel | 4 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | - | |
| Geiztriebbildung | - | |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel bis spät | 6 |
| - Verrieselungsneigung | - | |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering bis mittel | 4 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | leicht offen | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Traube | | |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Dichte | mittel bis dicht | 6 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | mittel bis spät | 6 |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Form | breit ellipsoid | 3 |
| - Hautfarbe | gelbgrün | 2 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | - | |
| - Oidium | - | |
| - Botrytis | - | |
| Mostgewicht | - | |
| Mostsäuregehalt | - | |
| Traubenertrag | - | |
| Holzausreife | - | |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | - | |
| - Geruch | - | |
| - Geschmack | - | |

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 23.01.2018)

Weißer Ertragsrebsorte 'Roter Riesling', Kenn-Nr.: RBE 309

Züchter: Hochschule Geisenheim, Institut für Rebenzüchtung
Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|-------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | mittel | 5 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | locker bis mittel | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering | 3 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | mittel bis stark | 6 |
| Geiztrieb Bildung | mittel | 5 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel bis spät | 6 |
| - Verrieselungsneigung | gering | 3 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | mittel | 5 |
| - Zahl der Lappen | drei | 2 |
| - Anordnung der Stielbuchtlappen | leicht überlappt | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | gering | 3 |
| Traube | | |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Dichte | mittel bis dicht | 6 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | spät | 7 |
| - Größe | klein | 3 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | dunkelrotviolett | 8 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | gelblichbraun | 1 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | gering | 3 |
| - Oidium | gering bis mittel | 4 |
| - Botrytis | gering bis mittel | 4 |
| Mostgewicht | mittel bis hoch | 6 |
| Mostsäuregehalt | hoch | 7 |
| Traubenertrag | mittel | 5 |
| Holzausreife | hoch bis sehr hoch | 8 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | gering | 3 |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | gelbgrün | 2 |
| - Geruch | duftig, neutral | 3/2 |
| - Geschmack | fruchtig, neutral, harmonisch | 6/4/3 |

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.06.2021)

Weißer Ertragsrebsorte 'Donauriesling', Kenn-Nr.: RBE 745Züchter: Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau,
Wiener Straße 74, 3400 Klosterneuburg, ÖSTERREICH

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh bis mittel | 4 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | locker | 3 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | sehr gering bis gering | 2 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | - | - |
| Geiztriebbildung | - | - |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | - | - |
| - Verrieselungsneigung | - | - |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Blasigkeit der Oberseite | mittel bis stark | 6 |
| - Zahl der Lappen | drei | 2 |
| - Anordnung der Stielbuchtlappen | leicht überlappt | 6 |
| - Anteil der Hauptadern mit Anthocyanfärbung auf der Oberseite | gering | 3 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Dichte | locker | 3 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | mittel bis spät | 6 |
| - Größe | klein | 3 |
| - Form | abgeflacht kugelförmig | 1 |
| - Hautfarbe | gelb | 3 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | gelblichbraun | 1 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | - | - |
| - Oidium | - | - |
| - Botrytis | - | - |
| Mostgewicht | - | - |
| Mostsäuregehalt | - | - |
| Traubenertrag | - | - |
| Holzausreife | - | - |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | - | - |
| - Geruch | - | - |
| - Geschmack | - | - |

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.04.2017)

Weißer Ertragsrebsorte 'Goldmuskateller', Kenn-Nr.: RBE 747

Züchter: Michael Kimmig (Rebschule Kimmig), Grünstadter Straße 4, 67271 Obersülzen

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---------------------------|------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh | 3 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | locker bis mittel | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | sehr gering bis gering | 2 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | - | |
| Geiztriebbildung | - | |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel bis spät | 6 |
| - Verrieselungsneigung | - | |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering | 3 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | leicht offen | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Dichte | locker | 3 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | spät | 7 |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | gelb | 3 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | Muskatgeschmack | 2 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | - | |
| - Oidium | - | |
| - Botrytis | - | |
| Mostgewicht | - | |
| Mostsäuregehalt | - | |
| Traubenertrag | - | |
| Holzausreife | - | |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | - | |
| - Geruch | - | |
| - Geschmack | - | |

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.04.2017)

Weißer Ertragsrebsorte 'Rosenmuskateller', Kenn-Nr.: RBE 748

Züchter: Michael Kimmig (Rebschule Kimmig), Grünstadter Straße 4, 67271 Obersülzen

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh | 3 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | locker | 3 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering | 3 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | hellkupferrot | 4 |
| Wüchsigkeit | - | |
| Geiztrieb Bildung | - | |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | spät | 7 |
| - Verrieselungsneigung | - | |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering | 3 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtlappen | geschlossen | 5 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | sehr gering bis gering | 2 |
| Traube | | |
| - Größe | groß | 7 |
| - Dichte | mittel bis dicht | 6 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | spät | 7 |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | dunkelrotviolett | 8 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | - | |
| - Oidium | - | |
| - Botrytis | - | |
| Mostgewicht | - | |
| Mostsäuregehalt | - | |
| Traubenertrag | - | |
| Holzausreife | - | |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | - | |
| - Geruch | - | |
| - Geschmack | - | |

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 25.03.2020)

Weißer Ertragsrebsorte 'Calardis Blanc', Kenn-Nr.: RBE 801

Züchter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Julius Kühn-Institut,
 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Erwin-Baur-Straße 27,
 06484 Quedlinburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|-------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | mittel | 5 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | dicht | 7 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering | 3 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | gelbgrün | 1 |
| Wüchsigkeit | mittel | 5 |
| Geiztrieb Bildung | mittel | 5 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | früh bis mittel | 4 |
| - Verrieselungsneigung | gering | 3 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering bis mittel | 4 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtlappen | leicht überlappt | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | sehr gering bis gering | 2 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Dichte | locker bis mittel | 4 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | mittel | 5 |
| - Größe | klein | 3 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | gelbrosa | 4 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | sehr gering bis gering | 2 * |
| - Oidium | gering bis mittel | 4 * |
| - Botrytis | sehr gering bis gering | 2 * |
| Mostgewicht | mittel | 5 |
| Mostsäuregehalt | gering bis mittel | 4 |
| Traubenertrag | mittel bis hoch | 6 |
| Holzausreife | hoch | 7 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - x) |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | gelbgrün | 2 |
| - Geruch | duftig/neutral | 3/2 |
| - Geschmack | fruchtig/harmonisch/würzig | 6/3/7 |

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar. [\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 23.01.2018)

Weißer Ertragsrebsorte 'Roter Müller Thurgau', Kenn-Nr.: RBE 1008

Züchter: Züchtermgemeinschaft Reben GbR, Schmiedegässle 9, 79285 Ebringen

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|-------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh bis mittel | 4 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | locker | 3 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering bis mittel | 4 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | gelbgrün | 1 |
| Wüchsigkeit | mittel bis stark | 6 |
| Geiztriebbildung | schwach bis mittel | 4 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel | 5 |
| - Verrieselungsneigung | gering | 3 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering bis mittel | 4 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtlappen | geschlossen | 5 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Dichte | mittel | 5 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | mittel | 5 |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Form | breit ellipsoid | 3 |
| - Hautfarbe | dunkelrotviolett | 8 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | gelblichbraun | 1 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | hoch | 7 |
| - Oidium | mittel | 5 |
| - Botrytis | mittel | 5 |
| Mostgewicht | mittel | 5 |
| Mostsäuregehalt | gering bis mittel | 4 |
| Traubenertrag | hoch | 7 |
| Holzausreife | hoch | 7 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | mittel bis hoch | 6 |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | gelbgrün | 2 |
| - Geruch | duftig, neutral | 3/2 |
| - Geschmack | fruchtig, neutral, harmonisch | 6/4/3 |

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 20.02.2020)

Weißer Ertragsrebsorte 'Rosa Chardonnay', Kenn-Nr.: RBE 1022

Züchter: Hochschule Geisenheim, Institut für Rebenzüchtung,
Von-Lade-Str. 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh | 3 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | locker bis mittel | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | - | - |
| Geiztriebbildung | - | - |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | - | - |
| - Verrieselungsneigung | - | - |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering bis mittel | 4 |
| - Zahl der Lappen | einer | 1 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | leicht offen | 4 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | sehr gering bis gering | 2 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Dichte | mittel bis dicht | 6 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | mittel bis spät | 6 |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | rosa | 5 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | - | - |
| - Oidium | - | - |
| - Botrytis | - | - |
| Mostgewicht | - | - |
| Mostsäuregehalt | - | - |
| Traubenertrag | - | - |
| Holzausreife | - | - |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | - | - |
| - Geruch | - | - |
| - Geschmack | - | - |

X) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.04.2020)

Weißer Ertragsrebsorte 'Sauvitage', Kenn-Nr.: RBE 1053

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Traubenplatz 5, 74189 Weinsberg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|-------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | sehr früh bis früh | 2 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | sehr locker bis locker | 2 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | sehr gering bis gering | 2 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | mittel | 5 |
| Geiztrieb Bildung | mittel bis stark | 6 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | früh bis mittel | 4 |
| - Verrieselungsneigung | gering bis mittel | 4 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | stark | 7 |
| - Zahl der Lappen | fünf | 3 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | geschlossen | 5 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Traube | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Dichte | locker bis mittel | 4 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | mittel bis spät | 6 |
| - Größe | klein | 3 |
| - Form | kugelförmig | 2 |
| - Hautfarbe | gelb | 3 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | dunkelbraun | 3 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | sehr gering bis gering | 2 * |
| - Oidium | gering bis mittel | 4 * |
| - Botrytis | sehr gering bis gering | 2 * |
| Mostgewicht | mittel bis hoch | 6 |
| Mostsäuregehalt | gering bis mittel | 4 |
| Traubenertrag | gering bis mittel | 4 |
| Holzausreife | hoch | 7 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - x) |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | gelbgrün/blass | 2/1 |
| - Geruch | duftig/fruchtig/neutral | 3/4/2 |
| - Geschmack | fruchtig/würzig/harmonisch | 6/7/3 |

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 - 50, Telefax: (0511) 95 66 96 00

Internet: www.bundessortenamt.de, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 20.02.2020)

Weißer Ertragsrebsorte 'Trebiano di Soave', Kenn-Nr.: RBE 1066

Züchter: Michael, Kimmig, (Rebschule Kimmig), Grünstadter Straße 4, 67271 Obersülzen

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
|--|---|------|
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | früh | 3 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | mittel bis dicht | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | sehr gering bis gering | 2 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | gelbgrün | 1 |
| Wüchsigkeit | - | - |
| Geiztriebbildung | - | - |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | - | - |
| - Verrieselungsneigung | - | - |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | mittel | 5 |
| - Blasigkeit der Oberseite | gering | 3 |
| - Zahl der Lappen | drei | 2 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | leicht überlappt | 6 |
| - Anthocyanfärbung der Adernoberseite | fehlend oder sehr gering | 1 |
| Traube | | |
| - Größe | groß | 7 |
| - Dichte | dicht | 7 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | spät | 7 |
| - Größe | mittel bis groß | 6 |
| - Form | breit ellipsoid | 3 |
| - Hautfarbe | gelbgrün | 2 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | orangebraun | 2 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | - | - |
| - Oidium | - | - |
| - Botrytis | - | - |
| Mostgewicht | - | - |
| Mostsäuregehalt | - | - |
| Traubenertrag | - | - |
| Holzausreife | - | - |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | - | - |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | - | - |
| - Geruch | - | - |
| - Geschmack | - | - |

*) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)